

IMPFKALENDER

Stand: 2016/2017

Nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO)

Empfohlenes Impfalter	Alter in Monaten					Alter in Jahren					
	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-17	ab 18	ab 60
Rotaviren ^{a)}	G1 <small>ab 6 Wochen</small>	G2	(G3)								
Wundstarrkrampf (Tetanus)	G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2		A ^{c)}	
Diphtherie	G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2		A ^{c)}	
Keuchhusten (Pertussis)	G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2		A ^{d)}	
Kinderlähmung (Poliomyelitis)	G1	G2 ^{b)}	G3	G4	N				A1	ggf. N	
Hepatitis B	G1	G2 ^{b)}	G3	G4	N						
Haemophilus influenzae Typ b (Hib)	G1	G2 ^{b)}	G3	G4	N						
Pneumokokken ^{e)}	G1		G2	G3	N						S ^{f)}
Meningokokken				G1 ^{g)}			N				
Masern, Mumps, Röteln (MMR)				G1	G2		N				S ^{h)}
Windpocken (Varizellen)				G1	G2		N				
Humane Papillomviren (HPV)											S ⁱ⁾
Influenza											S jährlich

G Grundimmunisierung S Standardimpfung A Auffrischimpfung N Nachholimpfung

a) Je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen im Mindestabstand von je 4 Wochen; Impfung bevorzugt bis zur 16. bzw. 22. Lebenswoche, spätestens bis zur 24. bzw. 32. Woche abschließen.

b) Bei Einzelimpfstoffen kann diese Dosis entfallen.

c) Auffrischimpfung alle 10 Jahre

d) Die nächste fällige Tetanus-Diphtherie-(Td)-Impfung soll einmalig mit einem Td-Pertussis bzw. Td-Pertussis-Poliomyelitis-Impfstoff erfolgen.

e) Frühgeborene erhalten 1 zusätzliche Dosis mit 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)

f) Einmalige Impfung, ggf. Auffrischimpfung

g) Ab dem vollendeten 12. Lebensmonat

h) Einmalige Masern-Impfung (MMR) für alle nach 1970 Geborenen ohne ausreichenden Impfschutz

i) Für alle Mädchen (bevorzugt von 9 - 14 Jahren): je nach Alter 2 oder 3 Impfungen im Schema 0 - 6 Monate bzw. 0 - 1 (2) - 6 Monate. Nachholimpfungen bis 17 Jahre empfohlen.

Ziel muss sein, möglichst frühzeitig einen vollständigen Impfschutz zu erreichen. Abweichungen sind möglich und ggf. notwendig.

